





1 Curita o Aceitero

- 2 **Animal invertebrado. Es un escarabajo negro que mide de 4 a 8 cm. Tiene un cuerpo alargado y negro, con bandas rojas entre los segmentos, tres pares de patas y dos antenas articuladas.** Tiene unas pequeñas alas al comienzo del abdomen, pero no vuela.
- 3 **Cuando es larva se alimenta de huevos de insectos. Cuando es adulto se alimenta de plantas** que devora usando sus mandíbulas y dejando solamente el nervio central de la hoja.
- 4 **Si se siente amenazado segrega un líquido rojo, una sustancia aceitosa irritante para la piel de sus enemigos. Es una manera de defenderse,** ya que al no poder volar puede ser presa fácil para otros animales.
- 5 **Los machos son menores que las hembras. Cuando un macho encuentra a una hembra la persigue hasta que lo acepta como pareja. Tras la cópula, la hembra pone miles de huevos.**
- 6 **La larva, cuando eclosiona, escala alguna planta esperando a que pase algún insecto para engancharse a él, sobre todo abejas, y la transporte a su nido. Inician entonces su época parasitaria.** Las que no lo consiguen mueren.
- 7 **Cuando son adultos habitan en zonas abiertas y bosques poco densos de la región mediterránea ibérica,** desde el nivel del mar hasta por encima de los 3.000 metros.
- 8 **Se distribuye por toda Europa.**
- 9 **Tiene dos nombres vulgares: curita, por los estudiantes de los seminarios con sotana negra y banda roja en la cintura que había hace años; y aceitero, por la sustancia aceitosa que segrega.**
- 10 **Su nombre científico es *Meloe majalis*.**