


# 2021

Planta del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Abies pinsapo



JARDÍN BOTÁNICO EL CASTILLEJO  
P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque, Cádiz



RED ANDALUZA  
JARDINES BOTÁNICOS  
EN ESPACIOS NATURALES



## ¿Cómo es?

Planta herbácea perenne, que alcanza el metro de altura. Pubescente, presenta pilosidad de color blanco en tallos y hojas, mientras que en las inflorescencias son de color pardo. Los tallos son erectos, gruesos, cilíndricos, con entrenudos largos, pilosos cuando jóvenes y glabrescentes cuando adultos. Sus hojas están divididas en folíolos, normalmente, en número de 7 a 12 pares. Inflorescencias axilares que salen desde la mitad de los tallos, con 10 a 20 flores, las cuales poseen un cáliz de color verdoso o rojizo, cubierto de pelos muy pequeños y oscuros; dientes 2-3 mm, linear-lanceolados. La corola es blanca o blanco-amarillenta, glabra, marcescente, que cambia a pardusca después de la antesis. El fruto es una legumbre, con pilosidad y que llega a medir hasta 7 cm que protege hasta 10 semillas parduscas y lisas.

**Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!**


El Castillejo. Avenida Camino del Castillejo, s/n, El Bosque (Cádiz). Tfno.: 956 716 134. Email: [jbotanico.castillejo.cagpds@juntadeandalucia.es](mailto:jbotanico.castillejo.cagpds@juntadeandalucia.es)

# Garbancillo del diablo

## *Erophaca baetica* subsp. *baetica* (L.) Boiss.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

SE  
ENCUENTRA  
EN ESTA  
ZONA DEL  
JARDÍN



## ¿Dónde crece?

Esta subespecie es endémica de la mitad sur de la Península Ibérica y noroeste de África (Argelia y Marruecos).

## ¿Dónde podemos encontrarla?

Habita en sotobosques de alcornocal, encinar y quejigal, así como en matorrales y en herbazales subnitrófilos, en un rango altitudinal que va desde el nivel de mar hasta casi los 1000 metros de altitud.

## ¿Sabías qué?

En Grecia, Turquía, Chipre y Líbano vive *Erophaca baetica* subsp. *orientalis*, que se diferencia de la subsp. *baetica* por tener los pelos de los tallos y raquis de las hojas más cortos y el haz pelosa. Además, en Argelia existen poblaciones intermedias entre las dos subespecies.

Se trata de una especie tóxica para el consumo, por ello en zonas de ganado es frecuente poder observarla, pues su consumo provoca el locoísmo. Se trata de una enfermedad crónica provocada por el alcaloide swainsonina que afecta al sistema nervioso y causa descoordinación y dificultad en el desplazamiento entre otros síntomas.

## ¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible