

Abies pinsapo

JARDÍN BOTÁNICO EL CASTILLEJO
P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Cómo es?

Planta perenne, de porte arbustivo que alcanza los 2,5 m. Las ramas jóvenes presentan costillas poco marcadas, corteza pardo-amarillenta e indumento denso de pelos no glandulíferos que les dan un tono blanquecino. Las hojas generalmente son tetraverticiladas, con una longitud de 4 a 6 mm, lineares y totalmente revolutas; hojas jóvenes puberulentas. Las inflorescencias aparecen en umbelas terminales de 4-10 flores. Pedicelos de 3,5 a 4,5 mm, pubescentes. Los sépalos de 2 a 3 mm, ovado-lanceolados, verdosos y pubescentes también; presentan el margen revoluto, con dos líneas pelosas blancas en el envés y borde membranáceo. Corola de 5 a 7 mm, tubular o urceolada (con forma de vasija parecida a una olla, orza), con lóbulos generalmente recurvos, y de color rosado. Anteras incluidas en la corola. Ovario pubescente. Estilo ligeramente exerto con estigma bien marcado. Fruto tipo cápsula de 2 a 2,5 mm, ovoide, densamente peloso, que encierra semillas minúsculas, de aproximadamente 0,7 mm, ovoides y de tono pardo-amarillento.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!


El Castillejo. Avenida Camino del Castillejo, s/n, El Bosque (Cádiz). Tfno.: 956 716 134. Email: jbotanico.castillejo.cagpds@juntadeandalucia.es

Brecina

Erica terminalis Salisb.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

SE
ENCUENTRA
EN ESTA
ZONA DEL
JARDÍN



¿Dónde crece?

Se desarrolla junto a márgenes de cursos de agua limpios y lugares frescos, de preferencia en umbrías; principalmente sobre suelos de carácter ácido aunque tolera los substratos calizos y ultrabásicos. Ocupa un rango altitudinal muy amplio que va desde los 100 metros hasta los 1700.

¿Dónde podemos encontrarla?

Se trata de un endemismo del occidente de la Cuenca del Mediterráneo, en la Península Ibérica sólo está presente en el este y sur. EN Andalucía puede ser observada, básicamente, en las provincias de Cádiz, Málaga y Granada.

¿Sabías qué?

La brecina, como muchas otras especies de brezos, ha sido utilizada tradicionalmente con fines terapéuticos (astringente, antiséptico urinario, diurético...), para lo cual se solían usar sus flores.

En Andalucía, su uso predominante ha sido la construcción de techos, setos y chambaos disminuyendo la insolación gracias al uso de sus tupidas ramas.

Actualmente, debido a la belleza de sus flores y largo periodo de floración, también se utiliza en jardinería.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible