Hebeloma con olor a rábano

Hebeloma sinapizans (Paulet:Fr.) Gillet

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC





¿Dónde crece?

Es una especie micorrizógena que vive en diferentes tipos de comunidades vegetales localizadas en ambientes esclerófilos o mesófilos, tales como los bosques de coníferas o de frondosas.

¿Dónde podemos encontrarla?

Especie frecuente muy bien representada en Andalucía. Fructifica en otoño e invierno.

¿Sabías qué?

Es una especie tóxica que provoca serios trastornos gastrointestinales.

Es un hongo fácil de identificar por el porte de los basidiomas, la presencia de una lengüeta colgante observable al corte en la zona de transición entre el píleo y el pie, la ausencia de cortina, el no exudar gotas a través de las laminillas y su olor rafanoide intenso.

Puede confundirse con *H. crustuliniforme*, pero este último es de menor tamaño, más blanquecino y en tiempo húmedo sus lámidas exudan gotitas hialinas.

¿Cómo es?

Basidioma de aspecto agaricoide, con píleo (sombrero) y pie bien diferenciados. Pie de 30-120 x 8-25 mm, robusto o esbelto, recto o curvado, cilíndrico, con la base ensanchada, rígido, macizo cuando joven y hueco con la edad, si bien en muchos ejemplares se observa al corte una lengüeta colgante la cual se localiza en la zona de intersección entre el sombrero y el estípite, de color blanquecino, beige o crema pálido. Base ensanchada, claviforme o bulbosa. Píleo de 40-130 mm de diámetro, de forma muy variable en sus fases iniciales, volviéndose plano-convexo en la madurez; cutícula viscosa cuando la humedad ambiental es elevada; pardo ocrácea con el margen blanquecino. Himenóforo formado por láminas apretadas, sinuosas, emarginadas, de color crema a pardo oscuras, arista floculosa de color blanco. Carne espesa y blanquecina. Olor fuerte a rábano y sabor también rafanoide que se vuelve muy amargo.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



