# Coprinopsis cinerea (Schaeff.)

Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Armillaria mellea



#### ¿Cómo es?

Basidioma agaricoide, delicado, gregario o aislado. Base algo engrosada, con frecuencia radicante, con tomento blanco. Pie cilíndrico, de 4-11 x 0,2-0,7 cm, macizo al principio, luego fistuloso, blanco, con la superficie finamente fibrilosa al principio y luego glabra. Pileo (sombrero) al principio elipsoide u ovoide, pronto acampanado y al final expandido; de 1-4(-5) cm de diámetro; inicialmente de color blanco, blanco grisáceo a crema con el centro pardusco y la superficie finamente escamosa por el velo; después de color gris con el centro pardo, superficie glabra o parcialmente cubierta por las escamas y fibrillas fugaces; estriada radialmente hasta la mitad. Himenóforo situado en la zona inferior del píleo, constituido por láminas libres, estrechas, muy apretadas, blanquecinas, luego gris pardusco y finalmente negras. Esporada de color negro a pardo negruzco. Carne escasa, membranosa, blanca, quebradiza y fibrosa en pie. Olor suave desagradable y sabor dulce.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

### ¿Dónde crece?

Especie coprófila que crece en grupos sobre excrementos de caballo y vaca, principalmente, o humus con abono.

# ¿Dónde podemos encontrarla?

Es una especie citada en Andalucía en otoño e invierno.

## ¿Sabías qué?

Es una especie sin interés culinario.

Tiene un tamaño relativamente robusto para ser un taxon coprófilo, por lo que no hay muchas especies con las que pueda confundirse.

Coprinopsis candidolanata tiene un tamaño de píleo de hasta 1,2 cm. C. macrocephala y C. radiata también son similares, pero difieren en el tamaño de las esporas. También puede confundirse con C. lagopus, pero este último no es coprófilo.

# ¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



