

2021

Seta
del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Armilaria mellea



JARDÍN MICOLÓGICO LA TRUFA
P. N. Sierras Subbéticas. Priego de Córdoba. Córdoba



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



Autor foto: Baldomero Moreno Arroyo

¿Cómo es?

Sombrero de hemisférico a aplanado, de 7 a 15 cm de diámetro, superficie lisa, seca, se separa fácilmente de la carne; de color blanco o con tonalidades ocre o rosadas; en ocasiones presenta placas grandes blancas, restos de la volva. Láminas moderadamente apretadas, blancas. Pie de 7-13 cm de longitud y 2-4 de grosor; de color blanco o con tonalidades similares a las del sombrero, cilíndrico, con un anillo débil, blanco, que desaparece pronto; en su base presenta una volva en forma de saco, membranosa, blanquecina, adquiere tonalidades ocre o rosadas con el roce o la edad. Carne muy densa, de color blanco; al corte o a la manipulación vira a tonos rosados. Sabor dulce y olor terroso intenso.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

La Trufa. Zagrilla, Priego de Córdoba (Córdoba). Tfno.: 671 599 562. Email: jmicologico.latrufa.cagpds@juntadeandalucia.es

Gurumelo

Amanita ponderosa Maleçon & R. Heim

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¿Dónde crece?

Frecuente y abundante creciendo semienterrada en terrenos pizarrosos pobres y secos. Es una especie micorrícica (establece simbiosis con las raíces de una planta) que vive asociada a la jara pingosa (*Cistus ladanifer*), jaguarzos (*Cistus* spp.), encina (*Quercus rotundifolia*) y alcornoque (*Quercus suber*), encontrándose también bajo pinos (*Pinus* spp). Fructifica en primavera, siendo generalmente marzo, el mes de mayor producción.

¿Dónde podemos encontrarla?

En la Península Ibérica se encuentra repartida por la zona centro y sur. Fuera de la Península es conocida del norte de África e Italia. En Andalucía se encuentra principalmente en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, aunque también está presente en Jaén, Málaga y Cádiz.

¿Sabías qué?

Es un excelente comestible, muy apreciado en algunas comarcas andaluzas como el Andévalo y PN. Sierra de Aracena y Picos de Aroche, PN. Sierra Norte de Sevilla, PN. Sierra de Hornachuelos y Valle del Guadiato.

Fructifica de forma semienterrada (semihipogeo), por lo que en ocasiones, su presencia se detecta por un ligero resquebrajamiento del suelo. Su recolección se realiza con la ayuda del llamado "pincho gurumelero", una herramienta a modo de pequeño bastón con la punta aplanada, que facilita su extracción.

Hay que extremar las precauciones de cara a su recolección pues podemos confundirla con *Amanita verna*, especie tóxica mortal. Esta última se diferencia por su crecimiento epigeo (por encima del suelo), su sombrero de color blanco inmaculado, su pie largo y esbelto, su anillo persistente, su carne de color blanco inmutable y su olor inapreciable.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible