

2018

Seta del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Amilaria mellea



JARDÍN MICOLÓGICO LA TRUFA

P. N. de las Sierras Subbéticas



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



Autor foto: Miguel Angel Ribes Ripoll

¿Cómo es?

Píleo (sombrero) de 4-12 cm de diámetro, hemisférico o campanulado en ejemplares jóvenes, luego aplanado o plano convexo, con o sin umbón central, en ocasiones deprimido en el centro; superficie lisa o con fibrillas innadas, seca o ligeramente viscosa, de color pardo. Himenóforo situado en la zona inferior del píleo, constituido por láminas apretadas, ventricosas, blanquecinas en ejemplares jóvenes, luego de color rosado, con el filo laminar ligeramente algodonoso. Pie de 4-10 x 0,5-2 cm, blanco, fácilmente separable del píleo, cilíndrico, a menudo con la base engrosada, con fibrillas longitudinales de color pardo o pardo grisáceo. Carne de color blanco o ligeramente grisácea, inmutable. Olor y sabor rafanoides.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

La Trufa. - Zagrilla - Priego de Córdoba (Córdoba) - Tfno: 671599562 - jmicologico.latrufa.cmaot@juntadeandalucia.es

Plúteo cervino

Pluteus cervinus (Schaeff.) P.Kumm.



ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

¿Dónde crece?

Crece directamente en madera, tocones viejos y restos de madera de angiospermas (*Quercus* spp., *Fagus* spp., *Eucalyptus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Ulmus* spp.) más raramente sobre madera de coníferas (*Pinus* spp.) o terrestre.

¿Dónde podemos encontrarla?

Especie saprófita que crece aislada o en pequeños grupos. Se encuentra presente en todas las provincias andaluzas, preferentemente en los meses de otoño e invierno, aunque puede aparecer en cualquier momento del año.

¿Sabías qué?

Se trata de la especie más común del género tanto a nivel ibérico como europeo, donde está ampliamente distribuida. Presente también en América, África, Asia y Australia.

Sus principales caracteres diagnóstico son la coloración parda del píleo, el olor rafanoide y la ausencia total de fíbulas.

Es una especie comestible sin interés, ya que tiene poca y escasa carne y su olor y sabor a rábanos denotan que no es de buena calidad.

Su nombre proviene del latín, “Cervinus” relativo al ciervo, por el color del sombrero similar al de la piel de dicho animal.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO