2016

**Planta del mes**

ENE FEB MAR ABR MAY **JUN**
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

# *Lactuca singularis* Wilmott

Europa
*invierte en las zonas rurales*

*Centaurea maríana*

JARDÍN BOTÁNICO UMBRÍA DE LA VIRGEN
*P. N. Sierra María-Los Vélez. María. Almería*

RED ANDALUZA JARDINES BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOJAS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| FLORES | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| FRUTOS | | | | | | | ■ | ■ | | | | |

## ¿Sabías qué?

Está incluida en la Lista roja de la flora vascular española y en la de Andalucía, calificada como "Vulnerable", con el sinónimo de *L. perennis* subsp. *granatensis*.

La escasez de esta especie se atribuye a la especificidad ecológica y a la discontinuidad de su frágil hábitat, el cual está protegido por la legislación Europea. El paso de ganado provoca el desplazamiento de las piedras sueltas, produciendo el desenraizamiento de ejemplares. La nitrificación excesiva origina la sustitución de las especies propias de los cascajares por otras más nitrófilas.

Fue recogida en junio de 1926 en el Cerro del Almirez (Sierra Nevada), material con el que se describió esta especie.

## ¿Cómo es?

Hierba de 7–20 cm., vivaz y sin pelos. Tallos erectos, ramificados en la parte superior. Las hojas son alternas, las basales arrosetadas, pinnatífidas o pinnatipartidas, a menudo liradas; las superiores sagitadas, con aurículas redondeadas. Inflorescencia en Capitulos de 2,5–4 cm de diametro, terminales, formando una Panícula corimbiforme; involucro de 12–27 mm, cilíndrico, con varias filas de brácteas; receptáculo sin escamas interseminales. Flores liguladas, azules. Fruto en Aquenio, con el cuerpo de 6–7 mm, marcadamente comprimido, de contorno estrechamente elíptico y rugoso, de color castaño–oscuro o negruzco, con reborde muy marcado y 1(3) costillas en cada cara; pico de 7–8 mm. Vilano blanco, de unos 9 mm y con 2 filas de pelos escábridos.

## ¿Dónde crece?

Es una planta habitual de canchales y pedregales de alta montaña, tanto en suelos calizos, dolomíticos como silíceos. Aparece normalmente entre 1800 a 2200 m de altitud.

## ¿Dónde podemos encontrarla?

Se trata de un endemismo del Sureste de la Península Ibérica: Andalucía oriental, y muy puntualmente en zonas limítrofes con Murcia y Albacete. En nuestra región aparece en algunas sierras de Granada, Almería y Jaén.

*¿Quieres visitar el jardín?*

Pincha aquí

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Umbría de la Virgen. - Paraje de la Umbría s/n, María (Almería) - Tfno: 697956046 - jbotanico.umbria.cmaot@juntadeandalucia.es

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO