

2020

Planta
del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Abies pinsapo



JARDÍN BOTÁNICO EL CASTILLEJO
P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Cómo es?

Planta perenne, con bulbo de 3-5 x 2,5-5 cm. Presenta túnicas coriáceas, pardo-violetas a casi negras, prolongándose hasta 3-10 cm por encima del bulbo. Vaina de 5-15 cm, parda clara o blanca. Desarrolla de 3 a 6 hojas por bulbo, lanceoladas y con un tamaño de 15-30 x 1-4 cm; así como de 1 a 6 flores. Estas flores se caracterizan porque poseen un tubo muy largo, de hasta 25 cm; los tépalos son de color rosa o purpúreo muchas veces con un entramado ajedrezado y un tamaño muy variable de 30 a 75 x 5,5-25 mm. Poseen 6 estambres, con filamentos de 9-20 mm y anteras medifijas de 5-11 mm, amarillas o purpúreas. Estilos soldados que sobrepasan la longitud de las anteras, aunque en ocasiones pueden tener un tamaño similar. Estigmas rosados, curvados de 1,5 a 4,5 mm. Fruto tipo cápsula, de 3-5 cm, oblongo-elípticas que protege las semillas de casi 3 mm.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!


El Castillejo. Avenida Camino del Castillejo, s/n, El Bosque (Cádiz). Tfno.: 956 716 134. Email: jbotanico.castillejo.cagpds@juntadeandalucia.es

Cólquico

Colchicum lusitanum Brot.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

SE
ENCUENTRA
EN ESTA
ZONA DEL
JARDÍN



¿Dónde crece?

Crece sobre suelos básicos preferentemente, en zonas baldías, terrenos pedregosos, taludes, claros de encinares, quejigales y olivares. Ocupa un rango altitudinal muy amplio que va desde casi el nivel del mar (30 m) hasta los casi 1500 metros.

¿Dónde podemos encontrarla?

Es una planta de amplia distribución, ocupando gran parte del Mediterráneo occidental. En la Península Ibérica es frecuente, sobre todo en el sur.

¿Sabías qué?

Esta planta ha sido utilizada tradicionalmente con fines medicinales, pues posee un compuesto, denominado colchicina, que se usa para el tratamiento de la gota a través de la movilización del ácido úrico. Actualmente, se usa esta molécula a partir del extracto de sus semillas. Su uso descontrolado provoca diarreas, vómitos y, en ocasiones, incluso la muerte.

Su periodo de floración coincide con el de otra bulbosa que nos puede confundir, concretamente con el falso azafrán (*Crocus serotinus* Salisb.). Esta planta pertenece a otra familia, Iridáceas, que posee 3 estambres y estilo dividido en 3 ramas más o menos divididas. De este modo podremos diferenciarlos fácilmente.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible