

# 2020

Seta  
del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	<b>OCT</b>	NOV	DIC

# Boleto cetrino

## *Suillellus luridus* (Schaeff.) Murrill

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

### ¿Dónde crece?

Frecuente en pequeños grupos, en bosques con *Quercus suber*, *Q. canariensis*, *Q. faginea*, *Q. ilex* subsp. *ballota*, *Castanea sativa* y *Pinus pinaster*.

### ¿Dónde podemos encontrarla?

Especie micorrizógena de bosques de planifolios o coníferas, preferentemente en suelo calizo. En nuestra región es común y se encuentra presente en todas las provincias durante el otoño.

### ¿Sabías qué?

Es un buen comestible a pesar de ser uno de los boletos que azulean rápidamente, pero se recomienda no ingerirla en crudo por poseer principios tóxicos que se destruyen con la cocción.

Esta especie destaca por el violento cambio de color de la carne, la presencia de poros rojos y el retículo rojizo en el pie sobre fondo amarillo.

Puede confundirse con *Suillellus queletii*, con la carne de la base del pie de color rojo y sin retículo; *Suillellus caucasicus*, con la carne amarilla bajo los tubos, en vez de naranja rojiza y *Suillellus comptus*, con esporas algo más pequeñas y base bastante radicante. Esta última parece ser más una variación ecológica de *S. luridus*.

### ¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 



Autor foto: Pablo Pérez Daniels

### ¿Cómo es?

Basidioma robusto, gregario. Pie de claviforme a cilíndrico, de 6-15 x 2-6(-9) cm, robusto, central, macizo; de color amarillo o amarillo anaranjado, purpúreo hacia la base; con la superficie ornamentada con un retículo alargado longitudinalmente que se disipa hacia el tercio inferior, de color rojo a anaranjado; azulea con la presión. Píleo al principio globoso, de hemisférico a plano convexo en la madurez, de 6-20(-25) cm de diámetro, de color pardo oliváceo, amarillo oliváceo o leonado, con tonos naranja rojizo; con la superficie afieltrada, mate; con el margen al principio incurvado y luego excedente. Himenóforo situado en la parte inferior del píleo, formado por tubos de hasta 2 cm de longitud, al principio amarillo o amarillo oliváceos, azulean al roce. Poros muy pequeños, redondos, al principio amarillo oliváceos, luego naranjas y finalmente rojos, azulean con el roce. Esporada de color pardo rojizo. Carne espesa, maciza al principio y blanda con el tiempo, de color amarillo o anaranjada, al corte azulea intensamente y tras un rato torna más pálido. Olor fúngico agradable y sabor dulce.

**Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!**

La Trufa. Zagrilla, Priego de Córdoba (Córdoba). Tfno.: 671 599 562. Email: [jmicologico.latrufa.cagpds@juntadeandalucia.es](mailto:jmicologico.latrufa.cagpds@juntadeandalucia.es)

Armilaria mellea



JARDÍN MICOLÓGICO LA TRUFA  
P. N. Sierras Subbéticas. Priego de Córdoba. Córdoba



RED ANDALUZA  
JARDINES BOTÁNICOS  
EN ESPACIOS NATURALES



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible