

ES6120015 Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz



Valores Ambientales de los Espacios Protegidos Red Natura 2000



Formaciones de acebuches (*Olea europea* var. *sylvestris*)

1. Figura Red Natura 2000

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Espacio propuesto como **Lugar de Interés Comunitario** en abril de 1999.


Declarado como **Zona Especial de Conservación** mediante el Decreto 1/2015, de 13 de enero.

2. Ámbito territorial

Términos municipales: Alcalá de los Gazules, Barbate, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia y Vejez de la Frontera (Cádiz)

Superficie: 26.488,40 ha

Localización:



■ ZEC y ZEPA

3. Medidas de Conservación

Plan de Gestión de la ZEC

Aprobado por la Orden de 17 de marzo de 2015.

Se publican sus anexos en la Resolución de 6 de mayo de 2019.

ES6120015 Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz

4. Valores ambientales

Vegetación y flora relevante

Las formaciones vegetales más representativas son las masas de acebuchales y, en menor medida, los alcornocales, lentiscares, pastizales, pinares, sabinares, matorrales halofíticos, bosques de ribera y formaciones palustres. La variabilidad en que las formaciones de acebuches (*Olea europea* var. *sylvestris*) hacen acto de presencia da lugar a que se puedan observar conformando bosques densos y sistemas adehesados, así como de forma dispersa alternando con zonas de matorral y pastizal, o entremezclado con otras especies de porte arbóreo como alcornoques (*Quercus suber*), eucaliptos (*Eucalyptus* spp.), pinos (*Pinus* spp.), etc.

En cuanto a las especies de flora relevantes hay que destacar el tomillo blanco (*Thymus albicans*), catalogada en *peligro de extinción* por el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA) y el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEa), así como cuatro especies *vulnerables* según CAEA: *Anthemis bourgaei*, *Euphorbia gaditana*, *Ononis azcaratei*, *Silene stockenii*.

Fauna relevante

El espacio representa una importante área de dispersión y asentamiento de rapaces como el águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*), entre otras. Alberga poblaciones de aves esteparias de interés para la conservación, como el cernícalo primilla (*Falco naumanni*).

También acoge otras especies amenazadas muy relevantes, entre ellas el Salinete (*Aphanius baeticus*), en grave peligro de extinción; el Ibis eremita (*Geronticus eremita*), una de las aves más amenazadas del planeta;

anfibios endémicos como el tritón pigmeo (*Triturus pygmaeus*) y la salamandra andaluza (*Salamandra salamandra* subsp. *longirostris*).

Hábitat de interés comunitario (HIC)

En el ámbito del ZEC se han identificado 14 HIC, de los que cuatro tienen carácter *prioritario*: Dunas litorales con *Juniperus* spp (2250), Dunas con bosques de *Pinus pinea* y/o *Pinus pinaster* (2270), Lagunas y charcas temporales mediterráneas (3170) y Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (6220).

Prioridad de conservación

- Hábitats vinculados a sistemas dunares
- Pastizales
- Hábitats vinculados a formaciones de acebuchales
- Águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*) y águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*)
- Salinete (*Aphanius baeticus*)
- *Euphorbia gaditana*
- Conectividad ecológica

Más información

www.juntadeandalucia.es/RedNatura2000