



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

RESERVA NATURAL
Laguna de Zóñar



Aves habituales en la Laguna de Zóñar

Curruca cabecinegra
Sylvia melanocephala

Llamativo alo rojo alrededor del ojo



Carbonero común
Parus major

Coronilla y babero negros, pecho amarillo



Verderón común
Chloris chloris

Mancha amarilla en ala y cola



Bisbita pratense
Anthus pratensis

Pecho estriado más amarillento



Reconocible por su repetitivo bis-bis-bit, este pájaro de plumaje terroso se mimetiza fácilmente con el suelo.

Se alimenta principalmente de semillas e insectos, que busca en zonas abiertas y arbustivas.

Pájaro insectívoro de pequeño tamaño, destaca por el plumaje oscuro de su cabeza en los machos. Frecuenta lentiscales, coscojares y bosquetes cercanos a la orilla lagunar.

Durante el otoño y el invierno también consume muchos frutillos, especialmente de acebuches y lentiscos.

Pequeña ave insectívora de llamativos colores y pico robusto. Fácil de reconocer por su repetitivo chí-chipán.

Habitual en olivos y zona arbustiva de coscoja y vegetación ribereña.

Pajarillo de color verdoso y pico robusto, frecuente árboles y arbustos altos del linderó de acceso a la laguna y en el área de olivar.

Se alimenta sobre todo de semillas.

Gallineta común
Gallinula chloropus

Escudete rojo y mancha amarilla en pico



Gallina de agua de color oscuro, aunque vista de cerca podemos apreciar brillos metálicos verdosos en su dorso, que destacan con el blanco de las plumas de su escudo anal.

Fácil de observar tanto en aguas libres como en el cinturón de carrizos de la laguna, donde sus largos dedos le permiten andar cómodamente entre ellos. De dieta omnívora, se la puede ver incluso bucear en busca de algún bocado.

Chorlitejo chico
Charadrius dubius

Collar blanco y negro



Ave de pequeño tamaño, cabeza voluminosa y largas patas amarillas. Es frecuente verla en la orilla de la laguna moviéndose con rapidez en busca de alimento.

Su principal dieta son los insectos, que caza en la superficie del fango debido a su corto pico.

• Más visible en invierno

Cigüeñuela común
Himantopus himantopus

Pico largo y agudo



Ave límicola inconfundible por sus larguísimas patas de color rosado y pico fino

Se alimenta de invertebrados en el limo de aguas someras, que captura mediante rápidos picotazos.

Como consecuencia de su alto valor ambiental forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía (RENPA) y de la lista de Humedales Ramsar de Importancia Internacional. Además, pertenece a la Red Natura 2000 por ser Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona Especial de Conservación (ZEC).

Para saber más/more information:



Garza imperial
Ardea purpurea

Gran pico. Cuello listado castaño claro y largas patas amarillas



Garza elegante de color terroso y púrpura, le gusta pescar en aguas poco profundas entre los carrizos. Su vuelo con el cuello curvado es característico.

Sus presas preferidas son los peces de mediano tamaño, anfibios, pequeños mamíferos y a veces incluso ratas de agua. Las captura con su largo pico, mediante un rápido movimiento de su cuello.

Cuchara común
Spatula clypeata

En vuelo se aprecia el color celeste de sus alas



A este ave se le distingue fácilmente por la forma de su pico, parecido a una cuchara está diseñado para filtrar todo tipo de alimentos: material vegetal, insectos, larvas, crustáceos, moluscos...

Es habitual ver a este pato en aguas someras de la laguna, aunque también le podemos observar en aguas más profundas arrancando la vegetación sumergida.

Malvasía cabeciblanca
Oxyura leucocephala

Pico celeste intenso en machos



Pato pardo de cabeza voluminosa y cuerpo rechoncho, inconfundible por su cola erguida y afilada. Se le ve zambullirse para arrancar vegetación del fondo lagunar con su robusto pico.

A las hembras les surca una franja oscura en la mejilla.