


## PROTOCOLO PARA TRATAMIENTO SECUENCIAL (PASO DE VÍA INTRAVENOSA A VÍA ORAL)



**Tabla 1.**

1. 2 ó más de los siguientes:
  - a. Temperatura  $>38^{\circ}\text{C}$  o  $<36^{\circ}\text{C}$
  - b. Frecuencia Cardíaca  $>90$
  - c. Frecuencia respiratoria  $>20$  rpm
  - d. Leucocitos  $>12000$  o  $<4000$  mm<sup>3</sup>
2. Neutropenia febril ( $<500$  neutrófilos/mm<sup>3</sup>)
3. Infecciones específicas que requieren tratamiento iv:
  - a. Endocarditis e infecciones endovasculares
  - b. Artritis Séptica
  - c. Osteomielitis
  - d. Infecciones del SNC
  - e. Abscesos
  - f. Fibrosis quística
  - g. Infección protésica
4. Compromiso de vía oral
  - a. Vómitos
  - b. Diarrea severa
  - c. Imposibilidad deglución
5. Necesidad de antibiótico no disponible por vía oral

**Tabla 2. Alternativas orales para fármacos con poca biodisponibilidad o no disponibles por vía oral que no presenten características anteriores.**

<b>Intravenoso</b>	<b>Oral</b>	<b>Comentario</b>
Ampicilina/Penicilina	Amoxicilina 1 gr/8h	En infecciones por Enterococo no es necesario clavulánico
Azitromicina	Azitromicina 250-500/24h	En general 3 días de tratamiento
Claritromicina	Claritromicina 500/24h	
Clindamicina	Clindamicina 300-450/8h	
Cloxacilina	Cefadroxilo 500 mg/12h, Amoxi/Clav 875/125/8h, Cotrimoxazol 800-160/12h, Levofloxacino 500/24h	En caso de bacteriemia por <i>S. aureus</i> consultar con Enf. Infecciosas
Cotrimoxazol	Cotrimoxazol 800-160/12h	
Ceftriaxona/Cefotaxima	Amoxicilina, Amoxi/Clavulánico, Cefuroxima 500/12h, levofloxacino	Neumococo: Amoxicilina Enterobacterias: Amoxi/Clav, Cefixima o Levofloxacino (última opción)
Doxiciclina	Doxiciclina 100/12h	Tomar incorporado con abundante agua
Linezolid	Linezolid <sup>1</sup> 600/12h	
Metronidazol	Metronidazol 500/8h	Evitar alcohol
Piper-Tazo	Amoxi/Clav + Cipro 500-750/12h(elección) Cipro + Metronidazol Cefixima 200/12h+ Metronidazol	Incluir Ciprofloxacino si riesgo de Pseudomonas. Pauta con Cipro o Cefixima si bajo riesgo de Enterococo y BLEE
Meropenem	Consultar con Enf. Infecciosas	
Vancomicina/Teicoplanina	Linezolid <sup>1</sup> , Cotrimoxazol, doxiciclina, Clindamicina	Si SARM: IPPB: Linezolid, cotrimoxazol, doxiciclina, clindamicina; Neumonía: Linezolid, cotrimoxazol Bacteriemia: Consultar con Enf. Infecciosas Si <i>Enterococo faecium</i> o <i>faecalis</i> en alérgicos a Penicilina: Linezolid, Cotrimoxazol (faecalis), fosfomicina 3 gr monodosis o 3 dosis cada 72h (ITU en faecalis)

<sup>1</sup> Fármaco de uso hospitalario. Requiere impreso de solicitud

IPPB: Infección de piel y partes blandas; SARM: *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina