



## RECOMENDACIONES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA TRAS LA REALIZACIÓN DE FISTULOGRAFÍA EN UNIDAD DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA

### ¿Qué se ha hecho?

Se trata de un procedimiento invasivo cuya finalidad es la visualización de arterias y venas mediante la inyección de contraste.

De esta forma hemos podido confirmar o verificar el funcionamiento de la fístula y las posibles alteraciones de la misma, realizando angioplastia en aquellos casos susceptibles de tratamiento.

### ¿Qué debe hacer a continuación?

Debe seguir las recomendaciones que a continuación se exponen para minimizar daños y efectos no deseados:

**1.-** Esperar en la sala de espera al menos 30 minutos tras colocación del vendaje compresivo para vigilar posibles sangrados en la zona de punción y adecuada compresión del vendaje. Transcurridos 30 minutos el personal de enfermería le dará el alta.

**2.-** Deberá mantener el vendaje compresivo, aflojándolo a las 6 horas de su colocación y retirándolo a las 24 horas en su centro de diálisis.

**3.-** Vigilar el vendaje, que permanezca limpio. En caso de sangrado, realizar compresión manual y si no cede transcurrido al menos 20 minutos con compresión, acudir al servicio de urgencias más cercano a su domicilio.

**4.-** Si dolor en la zona de punción, tomar el analgésico que tome habitualmente (nolotil, paracetamol, ibuprofeno...). Evitar tomar aspirina.

**5.-** Tras dos horas de la realización el procedimiento, podrá tomar su dieta habitual.

Paciente:

Fecha:

Nombre(s) y firma(s) de los profesional(es) de Enfermería: