*Significado de la reconexión
hidrológica entre el Estuario
del Guadalquivir y sus
marismas en la producción de
recursos naturales*

Resultados del proyecto:
PR.FEMPA.DIP2023B.005.02. Funcionalidad de la
comunidad de microalgas para la provisión de servicios
ecosistémicos mediante gestión hidrológica en ambientes
rehabilitados de marisma

**Comisión de
seguimiento de
la Reserva de
Pesca de la
desembocadura
del río
Guadalquivir**

**José Pedro Cañavate, César Vilas,
Ana Prieto, Catalina Fernández-Díaz**

26 de febrero 2025

Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica
Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Destrucción histórica de humedales

Diferentes
niveles de
alteración

scientific reports

OPEN Spatial-temporal changes
in the degradation of marshes
over the past 67 years

Jing Tang^{1,2†}, Ying Li^{1,2†}, Bolin Fu¹, Xiaomin Jia¹, Guo Yang^{1,2} & Xing Zhang^{1,2}

SAN FRANCISCO SCIENCE
ESTUARY & WATERSHED

Tidal Wetland Restoration in San Francisco Bay:
History and Current Issues

John C. Callaway¹, V. Thomas Parker², Michael C. Vasey³, Lisa M. Schile², and Ellen R. Herbert²

Estuarine, Coastal and Shelf Science (2014) 146:509

Content not available at ScienceDirect

Estuarine, Coastal and Shelf Science

journal homepage: www.elsevier.com/locate/estuarine

Losses of salt marsh in China: Trends, threats and management

Jiali Gu¹, Min Luo¹, Xinjuan Zhang¹, George Christakos^{2,3}, Susana Agustí⁴, Carlos M. Duarte⁵, Jiaoping Wu^{1,6}

Superficie original de marisma mareal estimada en el planeta

> [Brookhaven Symp Biol](#); 1973 Aug;(30):221-40.

Carbon in estuaries

G M Woodwell, P H Rich, C A Hall

380,000 km²

Superficie global de humedales mareales observada en 2019

RESEARCH | REPORTS [science.org](#) SCIENCE 744 13 MAY 2022 • VOL 376 ISSUE 6594

WETLAND ECOLOGY

High-resolution mapping of losses and gains of Earth's tidal wetlands

Nicholas J. Murray^{1*}, Thomas A. Worthington², Pete Bunting³, Stephanie Duce⁴, Valerie Hagger⁴, Catherine E. Lovelock⁴, Richard Lucas⁵, Megan I. Saunders⁵, Marcus Sheaves⁵, Mark Spalding⁶, Nathan J. Waltham⁷, Mitchell B. Lyons⁸

354,600 km²

Marismas 90,800 km²

Manglares: 135,900 km²

Planicies intermareales: 127,900 km²

76% de transformación global

Superficie total original considerada $\approx 1500 \text{ km}^2$

La recuperación de marismas aporta numerosas ventajas a la sociedad

Uses and management of saltmarshes: A global survey

E. McKinley ^{a,*}, J.F. Pagès ^{b,c}, M. Alexander ^d, D. Burdon ^{a,d}, S. Martino ^e

Devolver biodiversidad y funcionalidad biológica

Disponer de servicios ecosistémicos muy relevantes

Generación de actividades económicas alternativas

Reducción
eutrofización

Captura C

Generación de nuevos recursos
alimentarios de naturaleza extractiva

CHAPTER

27

The Value of Coastal Wetland
Ecosystem Services

Edward B. Barbier

Department of Economics, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, United States

Sistemas acuáticos con elevada productividad natural

Fuentes de alimento de máxima calidad

Review

Production of EPA and DHA in aquatic ecosystems and their transfer to the land

Michail I. Gladyshev^{a,b,c}, Nadezhda N. Sushchik^{a,b}, Olesia N. Makhutova^a

Con impacto positivo en ecosistemas terrestres

Captura y bioconversión exceso de nutrientes del medio

Wetlands (2021) 44: 144-153
 https://doi.org/10.1007/s12237-020-00880-4

ECOSYSTEMS

Wetlands as Sinks for Reactive Nitrogen at Continental and Global Scales: A Meta-Analysis

Stephen J. Jordan,¹ Jonathan Stoffler,² and Janet A. Nestlerode³

¹Gulf Ecology Division, U.S. Environmental Protection Agency, 1 Sabine Island Drive, Gulf Breeze, Florida 32561, USA; ²Department of Marine Biology, Penn State University, 200W. Avenue C, Gettysburg, Pennsylvania, 17325, USA

Generación de recurso acuícola y pesquero

Estuaries and Coasts (2021) 44:1440–1453
<https://doi.org/10.1007/s12237-020-00880-4>

Managed Wetlands Can Benefit Juvenile Chinook Salmon in a Tidal Marsh

Nicole M. Aha^{1,2} · Peter B. Moyle^{1,2} · Nann A. Fangue² · Andrew L. Rypel^{1,2} · John R. Durand^{1,2}

Disponibilidad de terrenos de marisma degradada e infrautilizados

Sistema Manego-Adventus

Junta de Andalucía

Finca Gabela-Honda

△ Especificidad en re-inundación marismas Guadalquivir

Nutrientes en exceso

50X valores naturales
3X valor regulado

≈ 160 Tm N año y m³/s

Para 50 m³/s

≈ 8.000 Tm/N año
(4M €/año)

Alta carga de sólidos en suspensión en el Estuario

Paso a marismas

Balance de nutrientes en el sistema acuático integrado

Sistema con alta biomasa de fitoplancton sostenida en el tiempo y concentración muy baja de N y P

Evaluación e integración de ciclos diarios de oxígeno y carbono inorgánico

Flujos de O₂Flujos de CO₂138 ± 69 mmol O₂ m⁻² d⁻¹-5.3 ± 2.4 mmol CO₂ m⁻² d⁻¹4 ± 76 mmol O₂ m⁻² d⁻¹-1.3 ± 2.3 mmol CO₂ m⁻² d⁻¹37 kg O₂ ha⁻¹ d⁻¹2 kg CO₂ ha⁻¹ d⁻¹Clorofila a: 41.3 ± 1.9 μg l⁻¹ ⇔ 117.8 ± 2.0 μg l⁻¹Producción primaria neta: 1 ⇔ 2 g C m⁻² d⁻¹

Dominio de especies de fitoplancton de alto valor nutricional

Consecuencias de la estructura de la comunidad de microalgas

Lípidos totales ricos en HUFA

- ARA: $2.8 \pm 1.8 \text{ mg g}^{-1}$
- EPA: $33.9 \pm 13.3 \text{ mg g}^{-1}$
- DHA: $45.2 \pm 17.8 \text{ mg g}^{-1}$

$\omega 3/\omega 6 = 4.8 \pm 1.3$

Producción de lípidos marinos $\Rightarrow 9.3 \text{ kg LT ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$

Concentrado en consumidores de bajo nivel

Lípidos de origen acuático muy demandados

1.0 Tm B ha⁻¹ y⁻¹

Soporte vida salvaje

Recursos explotables

1.5 Tm dw ha⁻¹ y⁻¹ Predicción producción especies bajo nivel trófico

Planctófagos: 0.01-0.14 g C m⁻² d⁻¹ (0.073-1 Tm B ha⁻¹ y⁻¹)

Invertebrados: 0.13-0.52 g C m⁻² d⁻¹ (0.95-3.8 Tm B ha⁻¹ y⁻¹)

Soporte trófico para

WETLANDS, Vol. 28, No. 3, September 2008, pp. 841-851
© 2008, The Society of Wetland Scientists

PRIMARY PRODUCTION AND CARRYING CAPACITY OF FORMER SALT PONDS AFTER RECONNECTION TO SAN FRANCISCO BAY

Julien Thébault^{1,2}, Tara S. Schraga¹, James E. Cloern¹, and Eric G. Dunlavy³

**☞ NPP ≈ 2.38 g C m⁻² d⁻¹
(17.3 Tm B ha⁻¹ y⁻¹)**

Gracias por la atención

Junta de Andalucía
José Pedro Cañavate
Investigador Coordinador
IFAPA
Centro El Toruño
Camino Tiro de Pichón s/n. 11500 Puerto de Santa María. Spain.
T: 671532086
josep.canavate@juntadeandalucia.es | www.juntadeandalucia.es

Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica

www.ifapa.es

Actividad financiada por proyecto FEMPA.DIP2023B.005, Funcionalidad de la comunidad de microalgas para la provisión de servicios ecosistémicos mediante gestión hidrológica en ambientes rehabilitados de marisma