

DENOMINACIÓN COMERCIAL ^(G)	NOMBRE CIENTÍFICO	CÓDIGO FAO	TALLAS MÍNIMAS AUTORIZADAS DE REFERENCIA A EFECTOS DE CONSERVACIÓN		CALIBRE MÍNIMO (M) (NOTA16)
			MEDITERRÁNEO (División 37.1.1)	ATLÁNTICO (División 27 IXa)	
PECES					
Abadejo	<i>Pollachius pollachius</i>	POL	—	30 cm (C, N) ^{(U) (K)}	300 g/Ud.
Acedía	<i>Dicologlossa cuneata</i>	CET	—	15 cm (N) ^(K)	—
Aguja / Agujeta	<i>Belone belone</i>	GAR	25 cm (N) ^(K)	25 cm (N) ^(K)	—
Alacha / Lacha	<i>Sardinella aurita</i>	SAA	—	—	—
Aligote / Besugo blanco	<i>Pagellus acarne</i>	SBA	17 cm (C) ^(U)	—	—
Anjova / Chova o Anchova	<i>Pomatomus saltatrix</i>	BLU	—	—	—
Arenque	<i>Clupea harengus</i>	HER	—	20 cm (C, N) ^{(U) (K)} (NOTA 5)	50 g/Ud. ó 20 Ud./kg
Arete aletón / Cabra	<i>Chelidonichthys obscurus</i>	GUM	—	—	—
Atún blanco o Bonito del Norte o Albacora	<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	—	—	1.500 g/Ud.
Atún rojo o de aleta azul	<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	115 cm ó 30 kg (C) ^{(P) (Q)} 75 cm ó 8 kg (C) ^{(P) (Q)} (NOTA 2) (NOTA 1)	115 cm ó 30 kg (C) ^{(P) (Q)} 75 cm ó 8 kg (C) ^{(P) (Q)} (NOTA 3) 70 cm ó 6,4 kg (C) ^{(P) (Q)} (NOTA 4) (NOTA 1)	6.400 g./Ud.
Bacaladilla	<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	15 cm (N) ^(K)	—	30 Ud/kg
Bacalao	<i>Gadus morhua</i>	COD	—	35 cm (C, N) ^{(U) (K)}	300 g/Ud.
Besugo, <i>Pagel</i>	<i>Pagellus spp.</i>	PAX	12 cm (N) ^(K)	—	—
Besugo / Besugo de la Pinta o Voraz	<i>Pagellus bogaraveo</i>	SBR	33 cm (C) ^(U)	36 cm (C) ^(U)	—
Blanquillo / Futbolista	<i>Branchiostegus semifasciatus</i>	UAE	—	—	—
Boga	<i>Boops boops</i>	BOG	11 cm (N) ^(K)	11 cm (N) ^(K)	70 Ud./kg
Bonito / Bonito del sur	<i>Sarda sarda</i>	BON	—	—	—
Boquerón o Anchoa	<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	9 cm (C, N) ^{(U) (K)}	9 cm (C, N) ^{(U) (J)} (NOTA 5)	8 g/Ud. ó 125 Ud./Kg
Breca	<i>Pagellus erythrinus</i>	PAC	15 cm (C) ^(U)	—	—
Breca chata / Garapello	<i>Pagellus bellottii</i>	PAR	12 cm (N) ^(K)	—	—
Burro o Roncaor / Borriquete	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	GBR	—	—	—
Caballa, <i>Estornino</i>	<i>Scomber spp.</i>	MAZ	18 cm (C) ^(U)	20 cm (C, N) ^{(U) (K)} (NOTA 5)	—
Caballa / Tonino	<i>Scomber scombrus</i>	MAC	18 cm (C, N) ^{(U) (K)}	20 cm (C) ^(U) (NOTA 5)	80 g/Ud. ó 325 Ud./25 kg (Med) 100 g/Ud. ó 250 Ud./25 kg (Atlántico)
Caballa del Sur o Estornino del Atlántico	<i>Scomber colias</i>	VMA	18 cm (C) ^(U)	20 cm (C) ^(U) (NOTA 5)	50 g/Ud.
Caballa del Sur o Estornino	<i>Scomber japonicus</i>	MAS	18 cm (C, N) ^{(U) (K)}	20 cm (C) ^(U) (NOTA 5)	—
Capellán	<i>Trisopterus minutus</i>	POD	11 cm (N) ^(K)	—	50 g/Ud.
Caramel	<i>Spicara smaris</i>	SPC	—	—	90 Ud./kg
Carbonero o Fogonero o Colin	<i>Pollachius virens</i>	POK	—	35 cm (C, N) ^{(U) (K)}	300 g/Ud.
Cherna / Romerete	<i>Polyprion americanus</i>	WRF	45 cm (C, N) ^{(U) (K)}	—	—
Chopa	<i>Spondyliosoma cantharus</i>	BRB	—	23 cm (N) ^(K)	180 g/Ud.
Congrio / Zafio	<i>Conger conger</i>	COE	—	58 cm (N) ^(K)	500 g/Ud.
Dorada	<i>Sparus aurata</i>	SBG	20 cm (C, N) ^{(U) (K)}	19 cm (N) ^(K)	—
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	—	30 cm (C, N) ^{(U) (K)}	170 g/Ud.
Espadín	<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	—	—	4 g/Ud. ó 250 Ud./kg
Faneca	<i>Trisopterus luscus</i>	BIB	—	—	50 g/Ud.
<i>Gallinetas</i>	<i>Sebastes spp.</i>	RED	—	—	350 g/Ud.
Gallos	<i>Lepidorhombus spp.</i>	LEZ	15 cm (N) ^(K)	20 cm (C, N) ^{(U) (K)}	50 g/Ud. (Mediterráneo) 110 g/Ud. (Atlántico)
Herrera	<i>Lithognathus mormyrus</i>	SSB	20 cm (C) ^(U)	—	—
<i>Japutas</i>	<i>Brama spp.</i>	BRA	—	—	200 g/Ud.
Japuta o Palometa / Palometa negra	<i>Brama brama</i>	POA	16 cm (N) ^(K)	16 cm (N) ^(K)	200 g/Ud.
<i>Jureles</i>	<i>Trachurus spp.</i>	JAX	15 cm (C) ^(U)	15 cm (C, N) ^{(U) (K)} (NOTA 5) (NOTA 6)	20 g/Ud.
Jurel	<i>Trachurus trachurus</i>	HOM	15 cm (C) ^(U)	15 cm (C, N) ^{(U) (K)}	20 g/Ud.
<i>Lenguados</i>	<i>Solea spp.</i>	SOO	—	24 cm (C) ^(U)	120 g/Ud.
Lenguado europeo / Lenguado macho	<i>Solea solea</i>	SOL	20 cm (C, N) ^{(U) (K)}	24 cm (C, N) ^{(U) (K)}	120 g/Ud.
Limanda o Lenguadina	<i>Limanda limanda</i>	DAB	—	23 cm (N) ^(K)	130 g/Ud.
<i>Lisa</i>	<i>Mugil spp.</i>	MGS	16 cm (N) ^(K)	20 cm (N) ^(K)	100 g/Ud.
Lubina o Robalo	<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	25 cm (C) ^(U)	36 cm (C, N) ^{(U) (K)}	—
<i>Marucas</i>	<i>Molva spp.</i>	LNZ	—	—	1.200 g/Ud.
Maruca	<i>Molva molva</i>	LIN	—	63 cm (C, N) ^{(U) (K)}	1.200 g/Ud.
Maruca azul o Pez palo o Palo	<i>Molva dypterygia</i>	BLI	—	70 cm (C, N) ^{(U) (K)}	1.200 g/Ud.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Pesca, Acuicultura y Economía Azul

Actualizado: AGOSTO 2025

DENOMINACIÓN COMERCIAL ^(G)	NOMBRE CIENTÍFICO	CÓDIGO FAO	TALLAS MÍNIMAS AUTORIZADAS DE REFERENCIA A EFECTOS DE CONSERVACIÓN		CALIBRE MÍNIMO (M) (NOTA16)
			MEDITERRÁNEO (División 37.1.1)	ATLÁNTICO (División 27 IXa)	
Mendo	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	—	28 cm (N) ^(K)	—
Mendo limón o Falsa Limanda	<i>Microstomus kitt</i>	LEM	—	25 cm (N) ^(K)	180 g/Ud.
Merlán	<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	—	27 cm (C) ^(U)	110 g/Ud.
Merluza o Merluza europea / Pescadilla o Pescada	<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	20 cm (C, N) ^{(U) (K)}	27 cm (C, N) ^{(U) (K)}	150 g/Ud. (Mediterráneo) 200 g/Ud. (Atlántico)
Meros	<i>Epinephelus spp.</i>	GPX	45 cm (C, N) ^{(U) (K)}	—	—
Mielga	<i>Squalus acanthias</i>	DGS	—	—	500 g/Ud.
Mojarra	<i>Diplodus vulgaris</i>	CTB	18 cm (C) ^(U)	—	—
Pargo / Bocinegro	<i>Pagrus pagrus</i>	RPG	18 cm (C, N) ^{(U) (K)}	15 cm (N) ^(K)	—
Patudo o Atún de ojo grande o Patudo del Atlántico	<i>Thunnus obesus</i>	BET	—	3,2 Kg (N) ^(K)	3.200 g./Ud.
Pez cinto o Sable plateado / Sable	<i>Lepidopus caudatus</i>	SFS	—	—	500 g/Ud.
Pez espada o Emperador / Aguja palá	<i>Xiphias gladius</i>	SWO	100 cm ó 11,4 kg (C) ^(P) (NOTA 8)	125 cm ó 25 kg (C) ^(P) (NOTA 9)	—
Pintarrojas	<i>Scyliorhinus spp.</i>	SCL	—	—	500 g/Ud.
Platija	<i>Platichthys flesus</i>	FLE	—	25 cm (N) ^(K)	200 g/Ud.
Rabil o Atún de aleta amarilla	<i>Thunnus albacares</i>	YFT	—	3,2 kg (N) ^(K)	—
Rapes	<i>Lophius spp.</i>	MNZ	30 cm (N) ^(K)	—	500 g/Ud. (entero vaciado) 200 g/Ud. (sin cabeza)
Raspallón / Alfajoa	<i>Diplodus annularis</i>	ANN	12 cm (C, N) ^{(U) (K)}	—	—
Rayas	<i>Raja spp.</i>	SKA	—	—	300 g/Ud.
Rayas (Alas)	<i>Raja spp.</i>	SKA	—	—	500 g/Ud.
Rémol / Parracho	<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	—	30 cm (N) ^(K)	—
Reo o Trucha marina	<i>Salmo trutta</i>	TRS	—	25 cm (N) ^(K)	—
Rodaballo	<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	—	30 cm (N) ^(K)	—
Rubios	<i>Trigla spp.</i>	GUY	—	—	60 g/Ud.
Sábalos, Alosas	<i>Alosa spp.</i>	SHZ	—	30 cm (N) ^(K)	—
Sable negro	<i>Aphanopus carbo</i>	BSF	—	—	500 g/Ud.
Salema	<i>Sarpa salpa</i>	SLM	15 cm (N) ^(K)	15 cm (N) ^(K)	—
Salmón atlántico o Salmón	<i>Salmo salar</i>	SAL	—	50 cm (N) ^(K)	—
Salmonetes	<i>Mullus spp.</i>	MUX	11 cm (C, N) ^{(U) (K)}	—	—
Salmonete de fango	<i>Mullus barbatus</i>	MUT	11 cm (C, N) ^{(U) (K)}	—	18 g/Ud. (Mediterráneo) 40 g/Ud. (Atlántico)
Salmonete de roca	<i>Mullus surmuletus</i>	MUR	11 cm (C, N) ^{(U) (K)}	15 cm (N) ^(K)	18 g/Ud. (Mediterráneo) 40 g/Ud. (Atlántico)
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	12 cm (C, N) ^{(U) (V) (K)} (NOTA 17)	11 cm (C, N) ^{(U) (K)} (NOTA 5)	11 g/Ud. ó 91 Ud./kg (Mediterráneo) 15 g/Ud. ó 67 Ud./kg (Atlántico)
Sargos	<i>Diplodus spp.</i>	SRG	15 cm (N) ^(K)	—	—
Sargo	<i>Diplodus sargus</i>	SWA	23 cm (C) ^(U)	—	—
Sargo breado / Sargo soldado o Sargo burgo	<i>Diplodus cervinus</i>	SBZ	15 cm (N) ^(K)	—	—
Sargo picudo	<i>Diplodus puntazzo</i>	SHR	18 cm (C) ^(U)	—	—
Solla	<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	—	27 cm (C) ^(U)	150 g./Ud.
MOLUSCOS					
Almejas	<i>Venerupis spp.</i>	VEN	25 mm (C, N) ^{(U) (K)}	—	—
Almeja Babosa o Chocha / Madrealmeja	<i>Venerupis corrugata</i> (V. pullastra)	VUC	38 mm (A) ^(F) 25 mm (C, N) ^{(U) (K)}	38 mm (C, A) ^{(U) (F)}	—
Almeja Blanca o Clica	<i>Spisula solida</i>	ULO	30 mm (A) ^(F)	30 mm (A) ^(F) 25 mm (C) ^(U)	—
Almeja de perro / Coquina de fango	<i>Scrobicularia plana</i>	OBN	35 mm (A) ^(F)	35 mm (A) ^(F)	—
Almeja Dorada o Pirulo	<i>Polititapes aureus</i>	VNA	35 mm (A) ^(F) 25 mm (C, N) ^{(U) (K)}	35 mm (A) ^(F)	—
Almeja Fina	<i>Ruditapes decussatus</i>	CTG	40 mm (A) ^(F)	40 mm (C, A) ^{(U) (F)}	—
Almeja Japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	CLJ	—	32 mm (C) ^(U)	—
Almeja Rubia o Roja / Almeja chocha	<i>Polititapes rhomboides</i>	VNR	35 mm (A) ^(F) 25 mm (C, N) ^{(U) (K)}	35 mm (A) ^(F)	—
Almeja tonta	<i>Glycymeris nummaria</i>	GCC	50 mm (A) ^(F)	50 mm (A) ^(F)	—
Almejón / Concha fina	<i>Callista chione</i>	KLK	60 mm (A) ^(F)	60 mm (C, A) ^{(U) (F)}	—
Berberecho / Verdigón	<i>Cerastoderma edule</i>	COC	24 mm (A) ^(F)	24 mm (A) ^(F)	—
Bocina	<i>Buccinum undatum</i>	WHE	—	45 mm (C) ^(U)	45 mm

DENOMINACIÓN COMERCIAL ^(G)	NOMBRE CIENTÍFICO	CÓDIGO FAO	TALLAS MÍNIMAS AUTORIZADAS DE REFERENCIA A EFECTOS DE CONSERVACIÓN		CALIBRE MÍNIMO (M) (NOTA16)
			MEDITERRÁNEO (División 37.1.1)	ATLÁNTICO (División 27 IXa)	
Busano	<i>Hexaplex trunculus</i>	FNT	60 mm (A) ^(F) (NOTA 10)	60 mm (A) ^(F) (NOTA 10)	—
Cañaila	<i>Bolinus brandaris</i>	BOY	70 mm (NOTA 10) ó 25 mm (NOTA 11) (A) ^(F)	70 mm (NOTA 10) ó 25 mm (NOTA 11) (A) ^(F)	—
Calamarín picudo / Puntillita	<i>Alloteuthis subulata</i>		—	—	—
<i>Chirlas</i>	<i>Venus spp.</i>	VEX	25 mm (C, N) ^(U) (K) [22 mm (Aguas Italianas)] ⁽¹⁹⁾	—	—
Chirla	<i>Chamelea gallina</i>	SVE	25 mm (C, A, N) ^(U) (F) (K) [22 mm (Aguas Italianas)] ⁽¹⁹⁾	25 mm (A) ^(F) 24 mm (A) ^(K) 20% tolerancia desde 1/8/24 al 31/1/25	—
Choco o Jibia o Sepia	<i>Sepia officinalis</i>	CTC	—	—	100 g/Ud.
Concha de peregrino	<i>Pecten jacobaeus</i>	SJA	100 mm (C, N) ^(U) (K)	—	—
<i>Coquinas, Tellinas, Pechinas</i>	<i>Donax spp.</i>	DON	—	25 mm (C) ^(U)	—
Coquina	<i>Donax trunculus</i>	DXL	25 mm (A) ^(F)	25 mm (C, A) ^(U) (F)	—
Corruco o Langostillo	<i>Acanthocardia tuberculata</i>	KTT	45 mm (A) ^(F)	45 mm (A) ^(F)	—
Escupiña grabada / Bolo	<i>Venus verrucosa</i>	VEV	50 mm (A) ^(F) 25 mm (C, N) ^(U) (K)	50 mm (A) ^(F) 40 mm (C) ^(U)	—
Globito robusto	<i>Rossia macrosoma</i>	ROA	—	—	100 g/Ud.
Longueirón	<i>Solen marginatus</i>	RAE	75 mm (A) ^(F)	75 mm (A) ^(F)	—
<i>Navajas o Muergos</i>	<i>Ensis spp.</i>	SOI	—	10 cm (C) ^(U)	—
Navallón	<i>Pharus legumen</i>	FRL	—	65 mm (C) ^(U)	—
Ostra rizada / Ostión	<i>Magallana gigas</i>	OYG	50 mm (A) ^(F)	50 mm (A) ^(F)	—
Pulpo / Pulpo o Pulpo roquero	<i>Octopus vulgaris</i>	OCC	1 kg (A, N) ^(D) (H)	1 kg (A, N) ^(A) (E) (J) - 750 g (C) ^(U)	—
Reloj	<i>Dosinia exoleta</i>	DSX	40 mm (A) ^(F)	40 mm (A) ^(F)	—
<i>Vieiras</i>	<i>Pecten spp.</i>	KTZ	100 mm (N) ^(K)	—	—
Vieira o Venera / Peregrina	<i>Pecten maximus</i>	SCE	100 mm (A, N) ^(F) (K)	100 mm (C, A, N) ^(U) (F) (K)	100 mm
Zamburiñas	<i>Chlamys spp.</i>	SCX	—	40 mm (C) ^(U)	—
CRUSTÁCEOS Y OTROS INVERTEBRADOS (LT = Longitud total; CF = Longitud cefalotorácica)					
Barrilete o Boca	<i>Uca tangeri</i>	UCG	—	—	—
Bogavante europeo / Bogavante	<i>Homarus gammarus</i>	LBE	300 mm (LT) 105 mm (CF) (C) ^(U)	87mm (CF) (C) ^(U)	—
Buey de mar	<i>Cancer pagurus</i>	CRE	—	130 mm (NOTA 12) (C) ^(U)	130 mm (NOTA 13)
Camarón boreal o nórdico	<i>Pandalus borealis</i>	PRA	—	—	250 Ud./Kg
Camarón meridional	<i>Crangon crangon</i>	CSH	—	—	6,8 mm (NOTA 14)
Centolla o Centollo	<i>Maja squinado</i>	SCR	—	120 mm (C, N) ^(U) (K)	—
Cigalas (Enteras)	<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	70 mm (LT) 25 mm (CF) (C, N) ^(U) (K) (W)	70 mm (LT) 20 mm (CF) (C, N) ^(U) (K)	—
Cigalas (Colas)	<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	—	37 mm (C, N) ^(U) (K)	—
Coral rojo	<i>Corallium rubrum</i>	COL	7 mm (C, N) ^(R) (L) (NOTA 15)	7 mm (C, N) ^(R) (L) (NOTA 15)	—
Erizo de mar / Erizo	<i>Paracentrotus lividus</i>	URM	45 mm (A) ^(B) (C)	45 mm (A) ^(B) (C)	—
Gamba Roja del Mediterráneo / Gamba roja o rayada	<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	25 mm (CF) (N) ^(W)	—	—
Gamba Blanca o de Altura / Gamba	<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	20 mm (CF) (C) ^(U)	22 mm (CF) (C) ^(U)	—
<i>Langostas</i>	<i>Palinurus spp. (Palinuridae VLO)</i>	CRW	240 mm (LT) (N) ^(K) 90 mm (CF) (C) ^(U)	95 mm (C) ^(U)	—
Langosta / Langosta de piedra	<i>Palinurus elephas</i>	SLO	240 mm (LT) (N) ^(K) 90 mm (CF) (C) ^(U)	95 mm (C) ^(U)	—
Langosta real	<i>Panulirus regius</i>	LOY	240 mm (LT) (N) ^(K) 90 mm (CF) (C) ^(U)	—	—
Langosta mora	<i>Palinurus mauritanicus</i>	PSL	240 mm (LT) (N) ^(K) 90 mm (CF) (C) ^(U)	95 mm (C) ^(U)	—
Langostino mediterráneo / Langostino	<i>Penaeus kerathurus</i>	TGS	10 cm (N) ^(K)	—	—
Ortiquilla	<i>Anemonia sulcata</i>	NOW	17 gramos (A) ^(B)	17 gramos (A) ^(B)	—

NOTA 1: se autoriza captura incidental del 5% entre 8kg-30kg y 75-115cm.
NOTA 2: Pesca costera artesanal para su uso en fresco por los buques de cebo vivo, los palangreros y los atuneros con líneas de mano.
NOTA 3: Buques de cebo vivo y curricaneros.
NOTA 4: buques de cebo vivo de eslora <17m. Las excepciones a las tallas establecidas en las notas 1 a 4 se encuentran, además, sujetas a ciertas condiciones establecidas en las referencias (P) y (Q) de la normativa de aplicación.
NOTA 5: No se aplicará dentro del límite del 10 % del peso vivo de las capturas totales conservadas a bordo. Ver referencias (J) y (U).
NOTA 6: la talla mínima de referencia será de 12 cm en CIEM IX para el 5% de las cuotas de España.
NOTA 8: ó 10,2 kg eviscerado y sin agallas. Margen de tolerancia del 5 % en peso o número de ejemplares por desembarque de la captura total de pez espada.

NOTA 9: Margen de tolerancia del 15 % en número de los ejemplares, por desembarque, de la captura total de pez espada. Según la Recomendación CICA 17-02, como alternativa, las CPC pueden escoger la talla de 119 cm o 15 kg, sin tolerancia.

NOTA 10: Desde el ápice al extremo del canal sifonal.

NOTA 11: Anchura de la concha sin tener en cuenta las púas.

NOTA 12: Para bueyes capturados con nasas, hasta el 1 % de la captura total podrá consistir en pinzas sueltas. Para cualquier otro arte de pesca, máximo de 75 kg de pinzas sueltas de esta especie.

NOTA 13: Anchura de caparazón, medida por la parte más ancha.


NOTA 14: Anchura de caparazón.

NOTA 15: El coral rojo de colonias con un diámetro inferior a 7 mm, medido a 1 cm de la base de la colonia, no podrá ser extraído, conservado a bordo, transbordado, desembarcado, transportado, almacenado, vendido o expuesto ni propuesto a la venta como producto bruto. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados que establezcan un límite de tolerancia máxima del 10 % en peso vivo de colonias de coral rojo de talla insuficiente (< 7 mm).


NOTA 16: En los casos en que se hayan establecido tallas mínimas de referencia a efectos de conservación, éstas constituirán las dimensiones mínimas de comercialización. (Art. 47.2 R. (UE) N° 1379/2013 – OCM).

NOTA 17: En GSA 1, 5 y 6, permitiéndose un 20% diario de 11 centímetros. Ver referencia (V).

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS TALLAS	PECES: MEDICIÓN DE LA LONGITUD TOTAL
C = Productos pesqueros procedentes de Aguas Comunitarias . Para el mar Mediterráneo se incluyen también las aguas no comunitarias. N = Productos pesqueros procedentes de Aguas del caladero nacional . A = Productos pesqueros procedentes de Aguas del caladero andaluz (AAII y marisqueo)	A (Atún rojo): Desde el extremo de la mandíbula superior hasta el extremo de la espina caudal más corta (longitud a la horquilla) B (Pez espada): Desde el extremo de la mandíbula inferior hasta la horquilla de la aleta caudal. CKL (Pez espada): Desde el cleithrum a la quilla lateral. C (Resto de peces): Desde la punta de la cabeza/boca hasta el extremo de la aleta caudal.



LOS MOLUSCOS BIVALVOS SE MEDIRÁ SOBRE LA PARTE MÁS LARGA DE LA CONCHA	CRUSTÁCEOS: MÉTODOS DE MEDICIÓN
---	---------------------------------



NORMATIVA DE APLICACIÓN
(A) Orden de 11 de octubre de 1996 , por la que se regula la captura de pulpo en el Golfo de Cádiz.
(B) Orden de 5 de diciembre de 2021 , por la que se regula la modalidad de marisqueo en inmersión en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(C) Orden de 25 de mayo de 2020 , por la que se regula la actividad de marisqueo a pie profesional en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(D) Orden de 24 de febrero de 2016 , por la que se establecen medidas para la conservación del pulpo (<i>Octopus vulgaris</i>) en las aguas interiores del litoral mediterráneo de Andalucía.
(E) Orden de 25 de abril de 2017 , por la que se regula la captura de pulpo (<i>Octopus vulgaris</i>) con artes específicos en el caladero nacional del Golfo de Cádiz y se crea el Censo de embarcaciones autorizadas para dicha modalidad.
(F) Orden de 22 de febrero de 2018 , por la que se establecen las tallas mínimas de captura y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(G) Resolución de 24 de mayo de 2019 , de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España. (ACTUALIZACIÓN ANEXO ÚNICO marzo 2023)
(H) Orden APA/973/2002, de 23 de abril , por la que se establece un peso mínimo para el pulpo capturado en aguas exteriores del litoral mediterráneo peninsular y se prohíbe su pesca recreativa en las aguas exteriores del caladero mediterráneo de Andalucía.
(I) Orden AAA/658/2014, de 22 de abril , por la que se regula la pesca con el arte de palangre de superficie para la captura de especies altamente migratorias.
(J) Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto , por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz.
(K) Real Decreto 560/1995, de 7 de abril , por el que establece las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras.
(L) Real Decreto 629/2013, de 2 de agosto , por el que se regula la pesca de coral rojo y el procedimiento de autorización para la obtención de licencias para su pesca.
(M) Reglamento (CE) nº 2406/1996 del Consejo de 26 de noviembre de 1996 , por el que se establecen normas comunes de comercialización de determinados productos pesqueros.
(N) Reglamento (CE) nº 520/2007 del Consejo de 7 de mayo de 2007 , por el que se establecen medidas técnicas de conservación de determinadas poblaciones de peces de especies altamente migratorias.
(Ñ) Reglamento (UE) 2023/2124 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de octubre de 2023 , sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM.
(P) Reglamento Delegado (UE) 2015/98 de la Comisión de 18 de noviembre de 2014 , relativo a la aplicación de las obligaciones internacionales de la Unión en el marco del Convenio CICA y el Convenio cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental.
(Q) Reglamento (UE) 2023/2053 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 por el que se establece un plan de ordenación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo.
(R) Reglamento Delegado (UE) 2022/2587 de la Comisión de 18 de agosto de 2022 , por el que se modifica el R(UE) 2019/1241 respecto a la talla mínima de las chirlas (<i>Venus</i> spp.) en determinadas aguas territoriales italianas.
(T) Reglamento (UE) 2017/2107 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de noviembre de 2017 , por el que se establecen medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del Convenio (CICA)
(U) Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 , sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos.
(V) Orden APA/852/2023, de 13 de julio , por la que se establece un plan de gestión para la pesca con artes de cerco en el subcaladero Mediterráneo.
(W) Orden APA/423/2020, de 18 de mayo , por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo.
(X) Resolución de 23 de julio de 2025 , de la DGPAEA, por la que se autoriza la apertura temporal del caladero de chirla (<i>Chamelea gallina</i>) en las zonas de producción de moluscos bivalvos del Golfo de Cádiz. *Desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de enero de 2026
IMÁGENES: Atún rojo – NOAA – Dominio público; Pez espada – Wikifautia – Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional; Sardina – Gervais et Boulart – Dominio público; Langosta – Extraída del R. (CE) 850/98; Resto de imágenes – Junta de Andalucía